

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΟΛΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334

Βόλος

**Τηλέφωνο: 24210 66525 Fax : 24210
69545**

Πληροφορίες: Msc I. Παππά

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 3 /15.04.2011

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΩΪΔΙΟ: (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Η ασθένεια ευνοείται από ξηρό καιρό και ηλιοφάνεια και εξαπλώνεται εύκολα με τον άνεμο. Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, άνθη, καρπούς κλπ. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι η εμφάνιση λευκού εξανθήματος στις προσβεβλημένες επιφάνειες, οι οποίες στην συνέχεια νεκρώνονται.

Η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών από το παθογόνο φθάνει μέχρι τη σκλήρυνση του πυρήνα και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών.

Για την προστασία των καρπών και της τρυφερής βλάστησης από την ασθένεια, συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Εφόσον επικρατεί ξηρός καιρός με ηλιοφάνεια, οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, μέχρι το τέλος της περιόδου ευαισθησίας.

ΚΟΡΥΝΕΟ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Η ασθένεια ευνοείται από υγρό, βροχερό καιρό και εξαπλώνεται εύκολα με τον άνεμο.

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα, καρπούς και βλαστούς προκαλώντας καφέ κηλιδώσεις φύλλων οι οποίες στη συνέχεια γίνονται τρύπες (σύμπτωμα «τρύπες από σκάγια») ή συνενώνονται και σχίζονται, κηλιδώσεις καρπών και έλκη στους βλαστούς. Οι ιστοί του φυτού είναι ευπαθείς σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο μετά την πτώση των πετάλων και επανάληψη ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση – εξέλιξη της ασθένειας.

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ)

Ο υγρός και ψυχρός καιρός ευνοεί τις προσβολές από την ασθένεια. Στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης ή στην πτώση των πετάλων, συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο της καλλιέργειας, μυκητοκτόνο

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ (ΚΕΡΑΣΙΑ – ΒΥΣΣΙΝΙΑ)

Η ασθένεια εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα υπό μορφή κηλίδων οι οποίες συχνά συνενώνονται. Τα προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν πρόωρα. Η εξέλιξη της ασθένειας ευνοείται από πολύ υγρό και βροχερό καιρό.

Σε οπωρώνες όπου υπάρχει ιστορικό προσβολής από την ασθένεια συνιστάται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο, μετά την πτώση των πετάλων και επανάληψη ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εξάπλωση – εξέλιξη της ασθένειας

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ - ΚΕΡΑΣΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Σε οπωρώνες που διαπιστώνεται προσβολή να γίνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Το έντομο διαχειμάζει ως προνύμφη κυρίως σε ρωγμές του κορμού και των κλάδων. Την άνοιξη η προνύμφη τρέφεται από την νεαρή βλάστηση και στην συνέχεια νυμφώνεται ανάμεσα στα προσβεβλημένα όργανα.

Στους οπωρώνες όπου υπήρξε **σημαντικό πρόβλημα** από το έντομο τον προηγούμενο Αύγουστο- Σεπτέμβριο θα πρέπει να γίνει επίσκεψη για να επιβεβαιωθεί η παρουσία της προνύμφης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή, συστήνεται να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ (ΚΕΡΑΣΙΑ- ΒΥΣΣΙΝΙΑ)

Στους οπωρώνες όπου υπήρξαν προσβολές την περσινή καλλιεργητική περίοδο, συνίσταται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, μετά την πτώση των πετάλων.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο **www.minagric.gr**.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Βλειώρας Σπύρος