

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη

Τ.Κ. 38334 Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 66525 Fax : 24210 69545

Πληροφορίες: Msc I. Παππά

Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 4 /15.05.2012

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΑΝΑΡΣΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πρώτη πτήση και των δύο εντόμων είναι σε εξέλιξη. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν αρχικά την νεαρή βλάστηση και στην συνέχεια τους καρπούς.

Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ο ψεκασμός αποβλέπει στην θανάτωση των ακμαίων και των νεαρών προνυμφών που εκκολάπτονται πριν αυτές εισχωρήσουν μέσα στους νεαρούς βλαστούς και στους καρπούς.

Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτηθεί από το εντομοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, τις καιρικές συνθήκες και το ρυθμό ανάπτυξης του καρπού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Η πτήση των ακμαίων του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη κυρίως στην περιοχή του Τυρνάβου. Σε οπωρώνες όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών, συνιστάται να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΑΦΙΔΕΣ (ΜΕΛΙΓΚΡΕΣ) (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά)

Σε οπωρώνες που διαπιστώνεται προσβολή από αφίδες να γίνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η πτήση των ακμαίων είναι σε εξέλιξη. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν τους καρπούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ (Κερασιά): Το έντομο αναπτύσσεται συνήθως σε μεγάλους πληθυσμούς αυτή την εποχή. Οι προνύμφες προσβάλλουν τους καρπούς στο στάδιο κατά την αλλαγή του χρώματος. Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός στο στάδιο έναρξης αλλαγής του χρώματος, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ : Η πτήση των ακμαίων είναι σε εξέλιξη στις περισσότερες περιοχές. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν τους καρπούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ο υγρός καιρός που επικρατεί σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες ευνοεί την εκδήλωση – εξάπλωση μυκητολογικών ασθενειών. Να συνεχιστεί η κάλυψη των καλλιεργειών για κορύνιο και ωίδιο όπως αναφέρονται στο προηγούμενο δελτίο μας Νο 3, 3/5/2012.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης ενδείκνυται ο ψεκασμός με χαλκούχο υδατοδιαλυτό σκεύασμα για προστασία των δένδρων από παθογόνα που εισέρχονται από τις πληγές.

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Να τηρείται με προσοχή το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο **www.minagric.gr**.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Βλειώρας Σπύρος