

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

6.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:	<ul style="list-style-type: none">– Βροχές κατά τόπους, κυρίως στη βόρεια Κρήτη, ύψους 3-44 χλστ., με μέση θερμοκρασία 11-14°C και διυγράνσεις φύλλου διάρκειας 10 - 21 ωρών ανά 24ωρο, σημειώθηκαν το τριήμερο 18-20 Απριλίου και έδωσαν νέες μολύνσεις που η εμφάνιση τους αναμένεται τις επόμενες μέρες.– Καιρική αστάθεια με νυχτερινές δροσιές και πρόβλεψη βροχών.– Σε αρκετά αμπέλια παρατηρούνται συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις).
<i>Οδηγίες:</i>	Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται να γίνει καταπολέμηση στο διάστημα 29-30 Απριλίου . Να προτιμηθούν θεραπευτικά σκευάσματα. Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος και να καλύπτει καλά το φύλλωμα και τα σταφύλια.
ΩΙΔΙΟ:	Υπενθυμίζεται ότι είναι η σημαντικότερη ασθένεια των αμπελιών της Κρήτης. Σε αμπέλια που δεν είναι καλυμμένα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον περονόσπορο.
<i>Οδηγίες:</i>	

Ε Λ Ι Α - Π Ρ Ω Ι Μ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ: Στις πρώιμες περιοχές ξεκίνησε η άνθηση της ελιάς. Στις μεσοπρώιμες και στις όψιμες περιοχές συνεχίζεται το φούσκωμα των ανθέων και ο σχηματισμός των ανθοταξιών αντίστοιχα.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ:	Στο δίκτυο παγίδευσης των πρώιμων παραλιακών περιοχών , η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με αυξημένες συλλήψεις. Οι προνύμφες της ανθόβιας γενιάς καταστρέφουν τα άνθη.
<i>Διαπιστώσεις:</i>	
<i>Οδηγίες:</i>	<ul style="list-style-type: none">– Στις πρώιμες παραλιακές περιοχές συνιστάται ένας ψεκασμός σε ελαιώνες με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής), στην έναρξη της άνθησης. Ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δεν έχουν ανάγκη προστασίας. Στις βιολογικές καλλιέργειες η καταπολέμηση πρέπει να γίνεται στην ανθόβια γενιά καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα βιολογικής αντιμετώπισης της καρπόβιας γενιάς.– Να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σκευάσματα του Βάκιλλου της Θουριγκίας με επανάληψη του ψεκασμού σε 7-10 ημέρες.. Η εφαρμογή τους δεν βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα.

ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ: <i>Χρόνος επέμβασης:</i>	Οι προνύμφες προσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα των νεαρών βλαστών. Ανάγκη προστασίας έχουν οι νεαρές φυτείες, τα νεαρά και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα. – Πρώιμες περιοχές : 3 – 5 Μαΐου.
ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ – ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ : <i>Χρόνος επέμβασης:</i>	Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοκκοειδών συνιστάται αραίωμα της κόμης των δέντρων, αποφυγή άσκοπων αρδεύσεων και υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων. Στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές, όπου παρατηρούνται σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση στο διάστημα: 2 - 5 Μαΐου.
ΠΟΛΛΙΝΙΑ : <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i> <i>Χρόνος επέμβασης:</i>	Κοκκοειδές που προσβάλλει τα κλαδιά παραμελημένων ή εξασθενημένων δέντρων. Αναπτύσσεται κυρίως σε πληγές ή σκασίματα του φλοιού, στις μασχάλες των διακλαδώσεων και στα μάτια. Λόγω της απομόζησης των χυμών μειώνει τη νέα βλάστηση, (μικρού μήκους βλαστοί, μικροφυλλία) και προκαλεί νέκρωση των λεπτών κλαδιών. Τα μελιτώδη απεκκρίματα της ευνοούν την ανάπτυξη της καπνιάς. Καλλιεργητικές φροντίδες όπως η εξυγίανση των δέντρων με αφαίρεση των προσβεβλημένων και εξασθενημένων κλαδιών, η βελτίωση της ζωτικότητας και η διατήρηση της καλής θρεπτικής τους κατάστασης είναι αποτελεσματικότερες από τις χημικές επεμβάσεις. Στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές, μόνο σε σοβαρές προσβολές να γίνει καταπολέμηση στο διάστημα: 2 - 5 Μαΐου.
ΨΥΛΛΑ : (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)	Οι προσβολές είναι σποραδικές και περιοδικές. Περιπτώσεις μειωμένης ανθοφορίας και έντονης προσβολής στις ανθοταξίες (πάνω από 30% στο σύνολο των ανθέων) δικαιολογούν ένα ψεκασμό με εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Για να είναι αποτελεσματική η επέμβαση θα πρέπει να προστεθεί ειδικό διαβρεκτικό στο εντομοκτόνο, ώστε το διάλυμα να διαπερνά τα κηρώδη νημάτια και να φτάνει στις νύμφες του εντόμου. Σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συνιστάται καταπολέμηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών και ασθενειών να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

☒ Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr.

Ηράκλειο 27 Απριλίου 2011
 Ο Προϊστάμενος Δ/σης
 Τρουλλάκης Γιάννης