

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής- Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

2.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : Μηλιά -Αχλαδιά - Καρυδιά Χρόνος ψεκασμού:	<p>Στις ορεινές περιοχές, στο δίκτυο παγίδευσης, οι συλλήψεις αρσενικών ξεκίνησαν στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός στις ορεινές περιοχές (Δαμάστα, Οροπέδιο Λασιθίου, Οροπέδιο Κρουσώνα, κ.α.):</p> <ul style="list-style-type: none">- Με ωοκτόνα σκευάσματα : 28 - 31 Μαΐου (ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΑΝΘΑΝΙΛΙΠΡΟΛ)- Με ρυθμιστές ανάπτυξης: από τη λήψη του δελτίου μέχρι 3 Ιουνίου. (ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΕΙΝΤ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΕΙΝΤ, ΦΛΟΥΦΕΝΟΞΟΥΡΟΝ.)- Με κλασικά εντομοκτόνα ή ιολογικά τύπου κοκκιώσεων: 4 - 6 Ιουνίου. ΚΛΑΣΙΚΑ (ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ, ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ, ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ.)
Οδηγίες:	<p>Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 15-20 ημέρες ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου. Τα ιολογικά σκευάσματα είναι συμβατά με την βιολογική καλλιέργεια και πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 8-10 μέρες. Επειδή σε αυτήν τη γενιά ωτοκεί και στο φύλλωμα, να γίνει επιμελημένος ψεκασμός φυλλώματος και καρπών.</p>
ΣΕΖΙΑ : Οδηγίες:	<p>Είναι έντομο ξυλοφάγο και σοβαρός εχθρός των μηλοειδών. Η πτήση του εντόμου στο δίκτυο παγίδευσης ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Οι ωτοκίες ξεκινούν την περίοδο αυτή και συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τοποθετεί τα αυγά σε κορμούς ή χοντρούς κλάδους με πληγές, σχισμές, έλκη, τομές κλαδεύματος.</p> <p>Συνιστάται με τη λήψη του δελτίου επιμελημένος ψεκασμός κορμού και βραχιόνων με εντομοκτόνο μεγάλης υπολειμματικής διάρκειας. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά 15-20 ημέρες.</p>

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ασθένεια και διαπιστώνονται σημαντικές προσβολές κυρίως σε αχλαδιές.</p> <p>Σε περιόδους με έντονες δροσιές ή βροχές, που το φύλλωμα και οι καρποί παραμένουν βρεγμένα για περισσότερες από 9-10 ώρες τα δέντρα πρέπει να είναι προστατευμένα.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (Αχλαδιά)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p>	<p>Διαπιστώνονται προσβολές σε αχλαδιές.</p> <p><u>Συμπτώματα:</u> μαύρισμα ανθέων, καρπιδίων, φύλλων και βλαστών που μοιάζουν σαν «κάψιμο από φωτιά».</p> <p>Συνιστάται εβδομαδιαίος έλεγχος των δέντρων. Αν διαπιστώνονται προσβολές να αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα 20-25 εκατοστών και να καταστρέφονται. Τα εργαλεία κλαδέματος θα πρέπει να απολυμαίνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας με χλωρίνη ή οινόπνευμα.</p>

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει. Προσοχή στις οδηγίες χρήσης.

📄 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 26 Μαΐου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Ιωάννης