

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Α Μ Π Ε Λ Ι

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

12.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>Οδηγίες:</i>	Η δεύτερη πτήση ξεκίνησε και στις μεσοπρώιμες περιοχές. Παρατηρούνται οι πρώτες ωτοκίες στις μικρές ράγες. Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: – Μεσοπρώιμες περιοχές (όπως Φοινικιά, Προφ. Ηλίας, Αγ. Σύλλας, Επισκοπή, Αρχάνες, Κουνάβοι, Μυρτιά, Κρουσώνας, Ασίτες, Αγ.Μύρων, Πενταμόδι, Δαφνές, Γαρίπα, Τεφέλι, Πύργος, Ασήμι, Γκαγκάλες, Βαγιωνιά κ.α). Επιτραπέζια: 15 - 17 Ιουνίου Σταφιδάμπελα – κρασάμπελα: 17 - 19 Ιουνίου
<i>Τρόπος επέμβασης:</i>	Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια.
ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:	Σε αμπέλια των παραπάνω περιοχών που παρατηρούνται συμπτώματα να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ:	Σε επιτραπέζια αμπέλια των μεσοπρώιμων περιοχών, με ιστορικό σοβαρών προσβολών, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. Να βρέχονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες.
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>Οδηγίες:</i>	Η ασθένεια έχει καθολική και συνεχή εξάπλωση κυρίως στην Βόρεια και Κεντρική Κρήτη, σπάνια για τα αμπελουργικά δεδομένα του νησιού. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών. Σε περιόδους που σημειώνονται δροσιές ή υπάρχουν προβλέψεις για πιθανές βροχές, το φύλλωμα και τα σταφύλια πρέπει να είναι καλυμμένα.
ΩΙΔΙΟ:	Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα σε προσβολές και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Συνέχεια στην πίσω σελίδα

Ε Λ Ι Α

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ :	Οι όψιμες περιοχές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της πτώσης πετάλων - καρπόδεσης.
<i>Διαπιστώσεις:</i>	Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη έχει ξεκινήσει και στις όψιμες περιοχές, με αυξημένες συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων.
<i>Καταπολέμηση:</i>	Στις όψιμες περιοχές συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά των προνυμφών στο διάστημα: 16 - 20 Ιουνίου . Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μέτρια καρποφορία.
ΡΥΓΧΙΤΗΣ : (Μπίμπικας)	Προκαλεί μείωση της παραγωγής με την προσβολή των καρπών (πρώιμη καρπόπτωση).
<i>Συστάσεις:</i>	Σε ελαιώνες που διαπιστώθηκαν πέρυσι ζημιές (φαγώματα στο φύλλωμα και στους νεαρούς καρπούς) να γίνει ένας ψεκασμός των δέντρων <u>αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης</u> . Με την εκλογή κατάλληλου εντομοκτόνου (ντιμεθοείτ) γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω εχθρών και ασθενειών να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Παρακαλούνται οι αποδέκτες των δελτίων που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (**e-mail**), να το κοινοποιήσουν στην υπηρεσία μας προκειμένου να συμπεριληφθούν στον κατάλογο αποδεκτών αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αποστολή των δελτίων μέσω e-mail είναι άμεση με την έκδοση του δελτίου, χωρίς τυχόν καθυστερήσεις και επιβαρύνει λιγότερο το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας (χαρτί, εκτυπωτικά, τέλη ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, κ.α).

📧 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: **www.minagric.gr**

Ηράκλειο 10 Ιουνίου 2011

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης