

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Πληροφορίες: Μαρία Ζ. Ροδιτάκη – Νίκος Ι. Μπαγκής

23.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<p>Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και προκαλεί το σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινωμάτων) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων. <u>Οι μολύνσεις γίνονται μόνο από πρόσφατες πληγές και εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.</u> Πληγές δημιουργούνται κατά το κλάδεμα, το ράβδισμα ή μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο. Όταν τα κλαδιά έχουν πολλούς όγκους γίνονται καχεκτικά και ξηραίνονται. Ιδιαίτερα πρέπει να προστατεύονται τα μικρά δέντρα. Η Κορωνέικη (ψιλλολιά) είναι πολύ ευαίσθητη ποικιλία.</p> <p>Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:</p> <ul style="list-style-type: none">– Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.– Αμέσως μετά από παγετό ή χαλάζι συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο.– Μετά τη συγκομιδή, κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου, να γίνεται προληπτικός ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.– Τα προσβεβλημένα κλαδιά να αφαιρούνται το καλοκαίρι, με ξηρό καιρό και να καίγονται. Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται.– Για την εγκατάσταση νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται δενδρύλλια απαλλαγμένα από την ασθένεια.
ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ: <i>Διαπιστώσεις:</i> <i>Οδηγίες:</i>	<p>Ασθένεια που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, με χαρακτηριστικό σύμπτωμα την εμφάνιση κυκλικών νεκρωτικών κηλίδων, «μάτια παγωνιού» στην πάνω επιφάνεια. Προσβάλλονται τα παλαιότερα φύλλα στα χαμηλότερα μέρη του δέντρου, ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές με πυκνή φύτευση. Η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές ευνοούν την εκδήλωση της ασθένειας. Ευαίσθητες ποικιλίες, η Θρουμπολιά και η Τσουνάτη ενώ η Κορωνέικη είναι σχετικά ανθεκτική.</p> <p>Η αραιή φύτευση και το κατάλληλο κλάδεμα συμβάλουν στον περιορισμό της ασθένειας. Η καταπολέμηση είναι προληπτική. Σε ελαιοδέντρα ευαίσθητων ποικιλιών και σε περιοχές ευνοϊκές για το κυκλοκόνιο, συνιστάται ένας ψεκασμός με χαλκούχο μυκητοκτόνο πριν την έναρξη των βροχών.</p>

<p>Φ Ο Μ Α : (<i>Phoma incompta</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Χρόνια μυκητολογική ασθένεια. Διαπιστώνεται από <u>σταδιακή εμφάνιση διάσπαρτων ξερών και ημίξηρων νεαρών κλαδιών</u> (2-3 ετών) που διατηρούν τα ξερά φύλλα, στην κόμη μεγάλων κυρίως δέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται από πληγές, με βροχερό καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι ουλές που σχηματίζονται από την πτώση των φύλλων είναι σημεία εισόδου του μύκητα.</p> <p>Για την αντιμετώπιση της ασθένειας απαιτείται συστηματική αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδιών και καταστροφή με φωτιά κατά τη ξηρή περίοδο. Τα κλαδέματα πρέπει να γίνονται αργά την άνοιξη και να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος.</p> <p>Επιπλέον συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με προστατευτικά μυκητοκτόνα πριν την έναρξη των βροχών και επανάληψη αμέσως μετά τη συγκομιδή.</p>
<p>Κ Α Π Ν Ι Α :</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Είναι μύκητες που αναπτύσσονται πάνω σε μελιτώματα, κυρίως του λεκανίου. Κλαδίσκοι, βλαστοί και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς με αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων. Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση.</p> <p>Η εξάλειψη του λεκανίου και το κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την καπνιά. Μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα <u>μετά τη συγκομιδή</u> βοηθάει στον καθαρισμό των δέντρων.</p>
<p>ΛΕΙΧΗΝΕΣ :</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Πρόκειται για το κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και τους κλάδους των ελαιοδέντρων σε υγρές κυρίως περιοχές.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός <u>κορμών και κλάδων</u> κατά τη διάρκεια του χειμώνα με χαλκούχα σκευάσματα.</p>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα φάρμακα να επιλέγονται από τις λίστες που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάσετε και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης. Φροντίστε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

📄 Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 3 Οκτωβρίου 2011

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Γιάννης