

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: [pkpfhgpr@otenet.gr](mailto:pkpfhgpr@otenet.gr)







Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο  
[agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Νο11

- Ευδεμίδα:** Η δραστηριότητα μειώνεται σε πρώιμη - ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά.
- Ωίδιο:** Βλαστικά στάδια και εξέλιξη του μύκητα δίνουν αυξημένη επικινδυνότητα.
- Περνόςπορος:** Μη ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξή του - χαμηλή επικινδυνότητα.
- Τζιτζικάκι:** Συστηματικοί έλεγχοι. Αυξημένη η δραστηριότητα κατά θέσεις.
- Πλανόκοκκος:** Επιτραπέζια σταφύλια. Έλεγχος πριν το κλείσιμο των σταφυλιών.

### Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiolini				
		Στάδιο J καρπόδεση	Στάδιο K ανάπτυξη ραγών - κατακόρυφη θέση		Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών
Πρώιμη ζώνη				τα σταφύλια αρχίζουν να κλείνουν	
Μεσοπρώιμη			κατακόρυφη θέση σταφυλιού		
Όψιμη ζώνη		τέλος καρπόδεσης - ανάπτυξη ραγών			

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ:**  
(*Lobesia botrana*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Στην **πρώιμη - ενδιάμεση ζώνη** (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην **κάτω Μεσσαρά** οι συλλήψεις μειώνονται, οι ωτοκίες αραιώνουν και δικαιολογούν ψεκασμό μόνο σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια.

**Οδηγίες:**

**Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης για επιτραπέζια σταφύλια:**

Πρώιμη ζώνη	• Επιτραπέζια : 2 - 3 Ιουνίου
Ενδιάμεση ζώνη - κάτω Μεσσαρά	• Επιτραπέζια : 4 - 5 Ιουνίου

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

**Σημείωση.** Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές των νομών **Ρεθύμνου και Χανίων** θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

**ΩΙΔΙΟ:**  
(*Erysiphe necator*)



**Γενικές πληροφορίες:**

- Ο μύκητας έχει κάνει έντονη την παρουσία του, ευνοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας και τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.

**Οδηγίες:**

- Τα αμπέλια πρέπει να είναι **καλομμένα** την περίοδο αυτή χωρίς κενά προστασίας. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**  
(*Plasmopara viticola*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Εκτός από τον ορεινό Μυλοπόταμο, το οροπέδιο Λασιθίου και ορεινές - ημιορεινές περιοχές γύρω και κοντά στο οροπέδιο, δεν σημειώθηκαν αξιόλογες βροχοπτώσεις και δεν ευνοήθηκε η εξέλιξη της ασθένειας.

**Οδηγίες:**

- **Να μην γίνονται άσκοποι ψεκασμοί.** Σύμφωνα με τις καιρικές προβλέψεις αναμένονται δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα (σταθεροποίηση του καιρού, μείωση της υγρασίας, άνοδος της θερμοκρασίας).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

**ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:**  
(*Empoasca* spp)



**Οδηγίες:**

- Σε αμπέλια όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνεται όριο επιζημιότητας (50 - 100 άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά 100 φύλλων) να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

**ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:**  
(*Planococcus ficus*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Στο δίκτυο παρατηρήσεων, υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης δραστηριότητας την φετινή χρονιά. Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

**Οδηγίες:**

- Σε επιτραπέζια σταφύλια της πρώιμης και ενδιάμεσης ζώνης όπου μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται αντιμετώπιση **πριν από το κλείσιμο των σταφυλιών.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [πλανόκοκκο πατήστε εδώ](#)

### **Φάρμακα :**

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 1 Ιουνίου 2018  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).