

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°7

Ευδεδίκα: Ενδιάμεση ζώνη - Κάτω Μεσσαρά - Μεσοπρώιμη ζώνη . Έναρξη γενιάς.




Ωίδιο: Ευαίσθητα βλαστικά στάδια.

Περυνόσπορος: Συστηματικός έλεγχος και καταπολέμηση όπου εμφανίζεται.

Τζιτζικάκι: Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις. Συστηματικοί έλεγχοι.

Υπενθόμιση: Η κατάχρηση επεμβάσεων οδηγεί σε επικράτηση ανθεκτικών πληθυσμών φυτοπαρασίτων (εντόμων - μυκήτων) και σε ανατροπή της βιολογικής ισορροπίας στο οικοσύστημα του αμπελιού, λόγω εξολόθρευσης των ωφέλιμων οργανισμών.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggiolini			
		Στάδιο Ι Άνθηση	Στάδιο J Καρπόδεση	Στάδιο Κ Ράγες σε ανάπτυξη
Πρώιμη ζώνη			Επικρατεί το Κ, ανάπτυξη ραγών	
Μεσοπρώιμη		Επικρατεί το J, καρπόδεση		
Οψιμη ζώνη		Επικρατεί το Ι, άνθηση		

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η 2^η πτήση έχει ξεκινήσει στην **ενδιάμεση ζώνη**, στην **κάτω Μεσσαρά** και στην **μεσοπρώιμη ζώνη**.
- Παρατηρούνται οι πρώτες αραιές ωτοκίες και οι πρώτες προνύμφες αναμένονται από 16 Μαΐου στην ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά και από 19 Μαΐου σε περιοχές της μεσοπρώιμης ζώνης.

Οδηγίες:

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης με σκευάσματα εναντίον προνυμφών:

Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά:

- **Επιτραπέζια:** 16 - 17 Μαΐου.
- **Σουλτανίνα - σινάμπελα:** 18 - 20 Μαΐου.

Μεσοπρώιμη ζώνη:

- **Επιτραπέζια:** 19 - 21 Μαΐου.
- **Σουλτανίνα - σινάμπελα:** 21 - 23 Μαΐου.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις όψιμες περιοχές καθώς και για το νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)



Γενικές πληροφορίες:

Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι πολύ ευαίσθητα και την περίοδο αυτή ευνοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας.

Οδηγίες:

- Τα βλαστικά στάδια της άνθησης - καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών ραγών (1 - 2 εβδομάδες που ακολουθούν μετά την καρπόδεση) πρέπει να είναι προστατευμένα.

- Να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης. Προσοχή το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30 °C μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων την περίοδο αυτή λόγω της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 7 Μαΐου.

Οδηγίες:

- Να γίνεται συστηματικός έλεγχος.

- Καταπολέμηση **μόνο σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα** και κυρίως σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές ή με πρόβλεψη βροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στις δειγματοληψίες υπαίθρου δεν διαπιστώνεται υψηλό ποσοστό άπτερων ατόμων και επειδή η παρουσία του εντόμου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή αλλά και από αμπέλι σε αμπέλι θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι πριν από τις αποφάσεις φυτοπροστασίας.

Οδηγίες:

- Καταπολέμηση να γίνεται **μόνο όπου διαπιστώνεται το όριο επιζημιότητας** (50 - 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα). Ελέγχονται τα μεσαία φύλλα των ετήσιων βλαστών, στη κάτω πλευρά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 15 Μαΐου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).