

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr







Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°10

- Ευδεμίδα:** Επαναληπτικός ψεκασμός στην ενδιάμεση, κάτω Μεσσαρά και μεσοπρώιμη ζώνη.
- Ωίδιο:** Ευαίσθητα βλαστικά στάδια του αμπελιού και αυξημένη παρουσία του μύκητα.
- Περουόσπορος:** Καταπολέμηση σε αμπέλια με συμπτώματα. Επαγρύπνηση λόγω καιρικής αστάθειας.
- Τζιτζικάκι:** Συστηματικοί έλεγχοι. Αυξημένη η δραστηριότητα κατά θέσεις.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggjolini				
		Στάδιο Ι Άνθηση	Στάδιο J Καρπόδεση	Στάδιο Κ Ανάπτυξη ραγών - Κατακόρυφη θέση σταφυλιού	
				ανάπτυξη ραγών - κατακόρυφη θέση	
			Επικρατεί η ανάπτυξη ραγών		
Πρώιμη ζώνη				ανάπτυξη ραγών - κατακόρυφη θέση	
Μεσοπρώιμη			Επικρατεί η ανάπτυξη ραγών		
Όψιμη ζώνη		Επικρατεί η καρπόδεση			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στην **ενδιάμεση ζώνη** (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης), στην **κάτω Μεσσαρά** και στις **μεσοπρώιμες περιοχές** η 2^η πτήση σταδιακά κλιμακώνεται, η δραστηριότητα αυξάνει και οι ωοτοκίες πυκνώνουν.

Οδηγίες:

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω **ενδεικτικές ημερομηνίες**:

Ενδιάμεση ζώνη - κάτω Μεσσαρά (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 25 - 26 Μαΐου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 28 - 29 Μαΐου
Μεσοπρώιμες περιοχές (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 29 - 30 Μαΐου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου

ΠΡΟΣΟΧΗ. Να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε το **ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά.** Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις **μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές** των νομών **Ρεθύμνου και Χανίων** θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες:

Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν (ανάπτυξη ραγών) είναι πολύ ευαίσθητα και ο μύκητας ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες.

Οδηγίες:

- Την περίοδο αυτή τα **αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα.** Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Οδηγίες:

- Λόγω της καιρικής αστάθειας των επόμενων ημερών (πρόβλεψη ΕΜΥ), σε **περιοχές που έχει εμφανιστεί**, τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στις δειγματοληψίες υπαίθρου παρατηρείται σε ορισμένα αμπέλια υψηλό ποσοστό άπτερων ατόμων. Η παρουσία του εντόμου διαφέρει από αμπέλι σε αμπέλι για αυτό θα πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.

Οδηγίες:

- Σε αμπέλια όπου διαπιστώνεται **όριο επιζημιότητας μετά από έλεγχο** (50 - 100 άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά 100 φύλλων) να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ηράκλειο 24 Μαΐου 2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προαιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά.).