

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Ν° 29

(Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου - Λασιθίου)

Το δελτίο αφορά αμπέλια από την πρώιμη έως και την όψιμη ζώνη

Ευδεμίδα: Παρατεταμένη υψηλή δραστηριότητα από την 3^η γενιά του εντόμου σε όλες τις ζώνες.





Μύγα της Μεσογείου: Επιτήρηση σε επιτραπέζια σταφύλια της μεσοπρώιμης ζώνης.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Μην υλοποιάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρυτή, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.


Ενδεικτικά βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας				
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο N έναρξη - πλήρης ωρίμασης ωρίμαση	
Κλίμακα BBCH	81		85	
Πρώιμη ζώνη			ωρίμαση σταφυλιών	
Μεσοπρώιμη		Τα σταφύλια ωριμάζουν		
Όψιμη ζώνη	γυάλισμα σταφυλιών- έναρξη ωρίμασης			


ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Ευδεμίδα



Αυγά



Αυγό



Προσβολή



Προνύμφη



Προσβολές

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Το τελευταίο δεκαήμερο από την **πρώιμη** έως και την **όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου**, καταγράφονται αυξημένες συλλήψεις και πυκνές ωτοκίες.


Οδηγίες:

1. Αμπέλια της **πρώιμης ζώνης, της ενδιάμεσης (μεταξύ πρώιμης-μεσοπρώιμης) και της κάτω Μεσσαράς** που δεν συγκομίζονται άμεσα και που δεν είναι πρόσφατα καλυμμένα (δηλαδή έχει λήξει ή λήγει άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από τον προηγούμενο ψεκασμό) **συνιστάται να προστατευτούν άμεσα.**
2. Αμπέλια της **μεσοπρώιμης ζώνης** που δεν συγκομίζονται άμεσα και που δεν είναι πρόσφατα καλυμμένα **συνιστάται να προστατευτούν.** Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού:
 - **Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου: 14 - 16 Αυγούστου**
3. Στα αμπέλια της **όψιμης ζώνης** συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία. Ενδεικτικές ημερομηνίες ψεκασμού:
 - **Όψιμη ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου: 14 - 16 Αυγούστου**

➤ Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:
(*Ceratitis capitata*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές της μύγας) συνεχίζουν να καταγράφονται χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί.
- Στους ενδιάμεσους ξενιστές που η ωρίμασή τους προηγείται των σταφυλιών (φρούτα όπως βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, δαμάσκηνα όπου η μύγα μπορεί να αναπτύξει μεγάλους πληθυσμούς) οι προσβολές ήταν μειωμένες, συνεπώς και ο κίνδυνος προσβολών στα σταφύλια εμφανίζεται σχετικά περιορισμένος.

Οδηγίες:

- Τα επιτραπέζια χονδρόραγα σταφύλια, κυρίως της μεσοπρώιμης ζώνης, που βρίσκονται σε τοποθεσίες με ιστορικό ζημιών να ελέγχονται τακτικά για προσβολές. Μπορεί προληπτικά να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των εχθρών - ασθενειών δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν σε κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Ηράκλειο 12 Αυγούστου 2019

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη