

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ του ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 18

Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλή άρα και ο κίνδυνος προσβολών είναι πολύ μικρός.





Ωίδιο: Ευνοϊκές οι συνθήκες και ευαίσθητα ακόμα τα σταφύλια.

Περωνόσπορος: Προσοχή στη νέα βλάστηση στα αμπέλια με συμπτώματα λόγω καιρικών συνθηκών.

Τζιτζικάκι: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στη βλάστηση.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου


Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας				
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο Κ ανάπτυξη ραγών	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών		Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος
Κλίμακα BBCH	75	77		81
Πρώιμη ζώνη		έναρξη γυαλισματος		
Μεσοπρώιμη		τα σταφύλια κλείνουν		
Όψιμη ζώνη	έναρξη κλεισίματος			

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

(*Lobesia botrana*)



Ευδεμίδα



Αυγό



Προσβολή

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η δραστηριότητα έχει περιοριστεί σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες. Οι συλλήψεις εμφανίζονται χαμηλές και οι ωτοκίες είναι σχεδόν μηδενικές.

Οδηγίες:

1. Ο κίνδυνος προσβολών την εποχή αυτή είναι πολύ μικρός.
2. Σύμφωνα με τον υπολογισμό ημεροβαθμών και τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων, η 3^η πτήση του εντόμου εκτιμάται να ξεκινήσει :
 - ✓ στην πρώιμη ζώνη → μέσα στις επόμενες ημέρες,
 - ✓ στη μεσοπρώιμη ζώνη → μετά τα μέσα του μήνα,
 - ✓ στην όψιμη ζώνη → είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Σημείωση: Οι ημερομηνίες αντιμετώπισης διαφέρουν από αυτές της έναρξης της πτήσης. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σε επόμενα δελτία για τους ενδεικτικούς χρόνους αντιμετώπισης ανά ζώνη καλλιέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)

(χολέρα, σίρικας)



Δευτερογενείς μολύνσεις σε φύλλα και σταφύλια

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Αυτή την περίοδο εμφανίζεται το μέγιστο των προσβολών του μύκητα.
- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις γίνονται στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών καθώς και στη νέα βλάστηση.

Οδηγίες:

- Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή και ιδιαίτερα αυτά που έχει εμφανιστεί ο μύκητας, όπου διατηρεί αυξημένα μολύσματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(*Plasmopara viticola*)



Κηλίδες λαδιού σε φύλλα και προσβολή σε αναπτυγμένες ράγες

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες:

- Υπάρχουν αμπέλια με συμπτώματα σε πολλές τοποθεσίες και περιοχές.
- Στα αμπέλια με συμπτώματα, οι τοπικές βροχές και οι έντονες δροσιές που σημειώνονται αυτές τις μέρες, ευνοούν μολύνσεις στη νέα βλάστηση που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρες αποφυλλώσεις.
- Τα αμπέλια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα την περίοδο αυτή.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:

(*Empoasca spp*)



Τέλειο πτερωτό



Άπτερη νόμφη

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Σε αρκετά αμπέλια διαπιστώνονται πληθυσμοί πάνω από το όριο επέμβασης, κυρίως από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη.

Οδηγίες:

- Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι : στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού.
- Ενδεικτικό όριο επέμβασης : 50-70 άπτερα άτομα ανά 100 τυχαία φύλλα. Η επέμβαση κατευθύνεται στη βλάστηση και στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νόμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

Καλλιεργητικά μέτρα: Η ποκνή - πολύ ζωνή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια που ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων - μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή :

- ✓ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.
- ✓ Προτιμείτε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών & μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και δίνουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να ισχύουν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά.).

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 8 Ιουλίου 2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη