

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο №5

Περονόσπορος: Καιρική αστάθεια και παρουσία συμπτωμάτων → συνιστάται προστασία.






Ωίδιο: Δευτερογενείς μολύνσεις σε φύλλα και ανθοταξίες → να συνεχιστεί η προστασία.

Ευδεμίδα: Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Φαινολογικά στάδια

- Με την έκπτυξη της βλάστησης η χρονιά εμφάνιζε μια πρωιμότητα κατά 7-10 ημ. σε σχέση με το 2022. Ο δροσερότερος όμως του κανονικού μήνας Απρίλιος επιβράδυνε την εξέλιξη των βλαστικών σταδίων. Με τα σημερινά δεδομένα η χρονιά δεν εμφανίζει σημαντική διαφορά με το 2022.
- Στην ποικιλία σουλτανίνα και στην πρώιμη ζώνη καταγράφηκε εβδομαδιαία αύξηση του μήκους της βλάστησης από 8 - 18 εκ..

Πίνακας 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας					
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο F Εμφάνιση σταφυλιού	Στάδιο G Ξεχώρισμα σταφυλιού	Στάδιο H Μούρο		
Κλίμακα BBCH	53	55	57		
Αριθμός φύλλων	4-5 ξεδιπλωμένα φύλλα	6-10 ξεδιπλωμένα φύλλα	> 10-11 ξεδιπλωμένα φύλλα		
Πρώιμη ζώνη	Επικρατεί το στάδιο G, έχει ξεκινήσει το H (από 8-12 φύλλα, κυρίως 10)				
Μεσοπρώιμη	Επικρατεί το στάδιο G (από 6-10 φύλλα, κυρίως 7-8)				
Οψιμη ζώνη	Επικρατούν τα στάδια F,G κυρίως G (από 5-9 φύλλα, κυρίως 6-7)				

<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>   <p>Πρωτογενείς μολύνσεις - κηλίδες λαδιού</p>	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ο μύκητας έχει εγκατασταθεί σε περιορισμένες θέσεις στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του νησιού, κυρίως σε ακαλλιέργητα αμπέλια (βροχές 11 Απριλίου). Η πιθανότητα εμφάνισής του στη νότια πλευρά είναι μικρή προς το παρόν. - Οι ασθενείς βροχές - διυγράνσεις και οι νότιοι άνεμοι που επικράτησαν στη συνέχεια δεν επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξή του. Εξαιρέση αποτέλεσαν οι πολύ τοπικές βροχοπτώσεις με διυγράνσεις μεγάλης διάρκειας που σημειώθηκαν τις απογευματινές ώρες στις 22 Απριλίου (π.χ. Βενεράτο, Αλάγνι, Αρκαλοχώρι) και δίνουν αυτές τις ημέρες τα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). - Η καιρική αστάθεια που επικρατεί και οι προβλέψεις βροχοπτώσεων στις επόμενες ημέρες (πρόγνωση βροχοπτώσεων ΕΜΥ) μπορεί να ευνοήσουν περαιτέρω την εξάπλωση του μύκητα. - Η εμφάνιση του μύκητα είναι περιορισμένη προς το παρόν και η πορεία της ασθένειας θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. <p><u>Οδηγίες:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συνιστάται προστασία ιδιαίτερα στα αμπέλια που βρίσκονται σε τοποθεσίες που σημειώνονται συχνά νυχτερινές δροσιές (λάκκοι, ποταμίδες) όπως και στα αμπέλια με αυξημένο δείκτη κινδύνου (βόρεια και κεντρικά του νησιού). 2. Να συνεχιστούν οι συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό συμπτωμάτων της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις). 3. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση, να ενημερώνονται οι γείτονες αμπελουργοί και η υπηρεσία μας. <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο εδώ</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p>   <p>Πρώτες προσβολές (βλαστοί - σημαίες) με αλευρωμένη εμφάνιση)</p>	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι πρώτες προσβολές (βλαστοί - σημαίες) έχουν εμφανισθεί σε όλες τις ζώνες. Στους μολυσμένους βλαστούς αναπαράγονται διαρκώς νέα μολύσματα (αλευρωμένη εμφάνιση) και σταδιακά ο μύκητας εξαπλώνεται. Διαπιστώνονται ήδη δευτερογενείς μολύνσεις σε φύλλα και ανθοταξίες και ο δείκτης κινδύνου για νέες μολύνσεις είναι αυξημένος. - Στις πρωιμότερες ποικιλίες/περιοχές ακολουθούν ευαίσθητα βλαστικά στάδια (μούρο - άνθηση). <p><u>Οδηγίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Την περίοδο αυτή όλα τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα. ➤ Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα <p>Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώτες προσβολές) είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Στους πρώτους προσβεβλημένους βλαστούς αναπαράγονται μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ</p>
<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η 1^η πτήση του εντόμου είναι σε εξέλιξη σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες (πρώιμη, μεσοπρώιμη, όψιμη). Επισημαίνεται ότι η 1^η πτήση εξελίσσεται στην ανθοφορία και άλλων φυτών - ξενιστών εκτός από το αμπέλι. Οι προσβολές στα αμπέλια από τη δραστηριότητα της 1^{ης} πτήσης είναι χωρίς οικονομική σημασία. ➤ Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια ή εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

- ❖ Με εξαίρεση τα σκευάσματα Polyversum WP (*Pythium oligandrum* strain m1) και T34 BIOCONTROL (*Trichoderma asperellum* strain T34) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν **μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα**. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή **αφορούν μόνο το σταφύλι**. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
- ❖ **Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.**

Ηράκλειο 4 Μαΐου 2023
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από την εφαρμογή «i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για κατέβασμα σε Android Play Store
<https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives>
- Για κατέβασμα σε Apple Store
<https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080>

