

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616  
Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°6

**Ωίδιο:** Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κρίσιμα βλαστικά στάδια → συνιστάται προστασία.

**Περνόςπορος:** Ευαίσθητα βλαστικών σταδίων → θέλει προσοχή.

**Ευδεμίδα:** Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η έναρξη της 2<sup>η</sup> πτήσης στην πρώιμη ζώνη.

**Τζιτζικάκια:** Κατά θέσεις οι πληθυσμοί αυξάνουν → να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στη βλάστηση και όχι άσκοπες επεμβάσεις.

### Φαινολογικά στάδια

- Το 2025, σε σχέση με το 2024, δεν καταγράφεται σημαντική διαφορά ως προς την πρωιμότητα. Η άνθηση στην ποικιλία σουλτανίνα φέτος, εμφανίζεται σε παρόμοιες ημερομηνίες με πέρυσι.

### Πίνακας1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στην ΠΕ Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη πρωιμότητας				
Κλίμακα Baggiolini	<b>Στάδιο G</b> Ξεχώρισμα σταφυλιού	<b>Στάδιο H</b> Μούρο	<b>Στάδιο I</b> Άνθηση	<b>Στάδιο J</b> Καρπόδεση
Κλίμακα BBCH	55	57	65	71
Ξεδιπλωμένα φύλλα	6-10 φύλλα	11-16 φύλλα	> 16 φύλλα	
<b>Πρώιμη ζώνη</b>		<b>Από H έως J, επικρατεί το I</b>		
<b>Μεσοπρώιμη</b>		<b>Από H έως έναρξη I, επικρατεί το H</b>		
<b>Οψιμη ζώνη</b>	<b>Επικρατεί το μούρο (στάδιο H)</b>			

<p><b>ΩΙΔΙΟ:</b> (<i>Erysiphe necator</i>)</p>  	<p><u><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></u></p> <p>- Η ασθένεια της εποχής. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα και τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι πολύ ευαίσθητα.</p> <p><u><b>Οδηγίες:</b></u></p> <p>➤ Τα βλαστικά στάδια μούρο - άνθηση - καρπόδεση - ανάπτυξη ραγών πρέπει να είναι προστατευμένα.</p> <p>➤ Στα βλαστικά στάδια άνθησης - καρπόδεσης, συνιστάται να χρησιμοποιείται το <b>θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απόρι)</b>.</p> <p>Οι καιρικές συνθήκες της εποχής που ακολουθούν (θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια) ευνοούν την καλή προληπτική και θεραπευτική δράση του θειαφιού.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το <a href="#"><u>ωίδιο πατήστε εδώ</u></a></p>
<p><b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b> (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>  	<p><u><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></u></p> <p>- Ο μύκητας προς το παρόν περιορίζεται κοντά στις αρχικές θέσεις εμφάνισης.</p> <p>- Η επικράτηση νοτιάδων - συνθηκών μειωμένης υγρασίας, προς το παρόν έχουν περιορίσει την εξέλιξη του μύκητα. Η πορεία της ασθένειας και ο κίνδυνος προσβολών για τα αμπέλια θα εξαρτηθεί από τυχόν επόμενες βροχοπτώσεις. Στα αμπέλια που βρίσκονται σε τοποθεσίες που σημειώνονται συχνά νυχτερινές δροσιές (λάκκοι, ποταμίδες) υπάρχει πιο αυξημένος κίνδυνος εξέλιξης του μύκητα.</p> <p><u><b>Οδηγίες:</b></u></p> <p>➤ Συνιστάται λόγω της ευαισθησίας των βλαστικών σταδίων της εποχής, της περιορισμένης παρουσίας του μύκητα και των νυχτερινών δροσιών της περιόδου :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τα αμπέλια που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν ήδη εμφανιστεί συμπτώματα να είναι προστατευμένα κατά τη διάρκεια των ευαίσθητων σταδίων άνθησης - καρπόδεσης.</li> <li>2. Να συνεχιστούν οι έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό συμπτωμάτων. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων στις επόμενες ημέρες από τις δροσιές της περιόδου και όπου εμφανίζονται να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση.</li> </ol> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον <a href="#"><u>περονόσπορο εδώ</u></a></p>
<p><b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> (<i>Lobesia botrana</i>)</p>  	<p><u><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></u></p> <p>➤ Στην πρώιμη ζώνη οι συλλήψεις από την 1<sup>η</sup> πτήση (ανθόβια γενιά) μειώθηκαν. Στις υπόλοιπες ζώνες (μεσοπρώιμη, όψιμη) η πτήση είναι σε εξέλιξη. Επισημαίνεται ότι στην 1<sup>η</sup> πτήση οι προσβολές στα σταφύλια είναι χωρίς οικονομική σημασία με εξαίρεση τις πρώιμες ποικιλίες για επιτραπέζια χρήση όπως π.χ. prime, superior.</p> <p><u><b>Οδηγίες:</b></u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στις πρώιμες ποικιλίες για επιτραπέζια χρήση συνιστάται να ξεκινά η προστασία <b>αμέσως μετά την καρπόδεση</b>.</li> <li>2. Στα υπόλοιπα αμπέλια δε χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση. Θα ενημερωθείτε με επόμενα δελτία (πρώτα για τις πρώιμες περιοχές όπου αναμένεται η έναρξη της 2<sup>ης</sup> πτήσης στο επόμενο δεκαήμερο).</li> </ol> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την <a href="#"><u>ευδεμίδα πατήστε εδώ</u></a></p>
<p><b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:</b> (Διάφορα είδη)</p>   <p>Πτερωτό      Άπτερο</p>	<p><u><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></u></p> <p>- Υπάρχουν αμπέλια (κυρίως στη Μεσσαρά και στις πρώιμες περιοχές) όπου έχουν εμφανιστεί οι ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).</p> <p><u><b>Οδηγίες:</b></u></p> <p>➤ Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.</p> <p>Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1 - 2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.</p> <p>Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.</p> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα <a href="#"><u>τζιτζικάκια πατήστε εδώ</u></a></p>

## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

- ❖ Με εξαίρεση τα σκευάσματα PolyversumWP (*Pythium oligandrum* strain m1) και T34 BIOCONTROL (*Trichoderma asperellum* strain T34) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν **μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα**. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή **αφορούν μόνο το σταφύλι**. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
- ❖ Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

### Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα (ΦΠΠ) για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα ΦΠΠ ανά καλλιέργεια και εχθρό / ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 14 Μαΐου 2025  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη