

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616
Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.



Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου, Α.Σ. Κρουσώνα, Ν.Μπαγκής

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ Δελτίο Ν°4

(Ορεινές περιοχές)

<p>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : (<i>Carposapsa pomonella</i>) Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Στις ορεινές περιοχές του νησιού η 1^η πτήση παραμένει σε εξέλιξη.- Στο δίκτυο συλλήψεων αρσενικών οι πληθυσμοί σταδιακά μειώνονται. <p><u>Οδηγίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών.- Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης αντιμετώπισης : <p>❖ <u>Ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) :</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ 19 - 20 Ιουνίου.➤ Να γίνεται καλή διαβροχή σε καρπούς και φύλλωμα.
<p>ΣΕΖΙΑ: (<i>Sesia myoriformis</i>) (Μηλιά)</p>   	<p><u>Γενικές πληροφορίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Οι πεταλούδες της σέζιας ωοτοκούν σε κορμούς και σε βραχίονες.- Οι ωοτοκίες διαρκούν γενικά μέχρι και τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο.- Οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται στο φλοιό, αναπτύσσονται στο κάμβιο - ξύλο και παραμένουν εκεί 1 - 2 έτη μέχρι την μεταμόρφωσή τους σε πεταλούδες. <p><u>Οδηγίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Συνιστάται κατά την περίοδο ωοτοκίων - εκκολάψεων των προνυμφών να προστατεύονται κατά διαστήματα οι κορμοί και οι βραχίονες με κατευθυνόμενο ψεκασμό και καλή διαβροχή.- Το ασβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά στην εναπόθεση αυγών. Εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>)(Μηλιά) (<i>Venturia pirina</i>)(Αχλαδιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι σημαντικές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά διαστήματα την φετινή άνοιξη έχουν ευνοήσει εμφανίσεις συμπτωμάτων σε μηλιές και αχλαδιές όμως οι ξηροθερμικές συνθήκες της εποχής γενικά δεν ευνοούν τον μύκητα. <p><u>Οδηγίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Συνιστάται στους οπωρώνες που έχουν εμφανίσει συμπτώματα να συνεχιστεί η αντιμετώπιση σε περιόδους που σημειώνονται έντονες νυχτερινές δροσιές.
<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Oidium farinosum</i>) - (Μηλιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για την ασθένεια. - Οι καρποί είναι πλέον αρκετά ανθεκτικοί σε προσβολές από τον μύκητα αλλά η νέα και τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθής. <p><u>Οδηγίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. - Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με αυτόν για την καρπόκαψα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα σκευάσματα για την καλλιέργεια, για τον εχθρό ή την ασθένεια και για το βλαστικό στάδιο της εποχής.
- Εγκεκριμένα ΦΠΠ ανά καλλιέργεια και ασθένεια/εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον. Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα. Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας - προφύλαξης και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 17 Ιουνίου 2025
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη