

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σταύρου Νιάρχου (τέρμα)

Τ.Θ. 02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα

Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055

FAX : 26510 41902

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

5. 23 / 5 /2011

Βλαστικό στάδιο: Ζίτσα Ιωαννίνων (Ντεμπίνα) έξοδος 8^{ου} φύλλου. Σακελαρικό 14-16 φύλλα.

Λευκάδα (Χλώρη, Merlot), Κέρκυρα (Κακοτρύγης): 14-16 φύλλα παραμονές άνθησης.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι πρώτες κηλίδες περονόσπορου βρέθηκαν από 19/5/2011 στους πρώιμους αμπελώνες της περιοχής της Ζίτσας. **Οι συνθήκες εκδήλωσης επιδημίας είναι πολύ ευνοϊκές, γι' αυτό να αρχίσουν άμεσα ψεκασμοί, που πρέπει να ανανεώνονται ανάλογα με την διάρκεια δράσης του σκευάσματος, σε όλους τους αμπελώνες της Ζίτσας.** Αν χρησιμοποιούνται σκευάσματα επαφής, οι επαναλήψεις να γίνονται ανά 6-8 ημέρες με την προϋπόθεση ότι δεν θα εκπλυθούν από σημαντική βροχή. Αν χρησιμοποιηθούν διεισδυτικά σκευάσματα, που είναι και το προτιμότερο, να γίνονται εναλλαγές μεταξύ των κατηγοριών με επαναλήψεις ανά 10 μέρες. (βλ ΔΓΠ 3. 2/5/2011). Για τις άλλες περιοχές (Κέρκυρα & Λευκάδα) να συνεχιστεί η επιθεώρηση των αμπελώνων.

Δράση σε συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής με έντονη βλαστική δραστηριότητα (Μέγιστη Δράση)	
Επαφής : Χαλκός folpet, mancozeb, maneb, propineb, dithianon	Δράση <u>το πολύ 10 μέρες αν δεν εκπλυθούν</u> από βροχή μεγαλύτερη των 20 mm
Σκευάσματα που περιέχουν cymoxanil	Δράση 8 μέρες (10-12)
Σκευάσματα που περιέχουν zoxamide	Δράση 10 μέρες (10-12)
Σκευάσματα που περιέχουν: dimethomorphe, mandipropamid, benthiavalicarb, iprovalicarb	Δράση 10 μέρες (10-14)
Σκευάσματα που περιέχουν fosetyl	Δράση 10 μέρες (14)
Σκευάσματα που περιέχουν azoxystrobin, famoxadone, pyraclostrobin	Θεωρούμε ότι διαρκούν όσο η ουσία που τα συνοδεύει στο σκεύασμα
Σκευάσματα που περιέχουν Benalaxyl metalaxyl	Δράση 10 μέρες (14)

ΩΙΔΙΟ

Να συνεχιστεί η προστασία σε όλες τις περιοχές. Αν χρησιμοποιείται θείο βρέξιμο ή επίπασης οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται ανά 7 μέρες, ενώ για τα διεισδυτικά σκευάσματα αυτή την εποχή καλό είναι να ανανεώνονται στις 12 ημέρες σε όλες τις περιοχές. Να γίνονται εναλλαγές ανάμεσα στις κατηγορίες των διεισδυτικών σκευασμάτων βλ. ΔΓΠ 4, 12-5-2011

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων αν επικρατούν βροχές **πρέπει να γίνει ψεκασμός και για τον βοτρυτή.**

Κατάλληλα φάρμακα: Θειράμ, Φλουντιοξονίλ & Σπροντινίλ, Φολπέτ (δράση και στον περονόσπορο), Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Φενεξαμίντ, Φλουζινάμ, κ.α. (Διάφορα σκευάσματα.)

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος αυτήν την εποχή.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο αμιγώς χαλκούχα σκευάσματα για τον περονόσπορο και θείο (βρέξιμο ή επίπασης) για το ωίδιο. Στην περιοχή της Ζίτσας, αν παρατηρηθούν κηλίδες περονόσπορου μέσα σε βιολογικό αμπελώνα, να γίνει ξεφύλλισμα ώστε να αερίζονται οι ταξιανθίες, συμπληρωματικά της επιβεβλημένης προστασίας με χαλκούχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).