


# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης




Ακμαίο ευδεμίδας



Προνύμφη ευδεμίδας



Βοτρυτής



Ωίδιο

Πληροφορίες: Κ. Λύλης – Θ. Μαρκόπουλος  
Τηλ.: 2510 600421 - 420

Αρ. Δελτίου 10/09-08-12

## ΑΜΠΕΛΙ

### Ι.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η γ' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται προληπτικά να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- 11 - 12 Αυγούστου στις πρώιμες περιοχές.
- 13 - 14 Αυγούστου στις μεσοπρώιμες περιοχές, και
- 15 - 16 Αυγούστου στις όψιμες περιοχές.

Επανάληψη μετά από 7 - 8 ημέρες λαμβάνοντας υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.

### ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την καταπολέμηση της ευδεμίδας. Σε σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης να προτιμηθούν σκεύασμα του βάκιλλου θουριγγίας.

### ΙΙ. ΒΟΤΡΥΤΗΣ.

Συνιστάται να γίνει προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπελίες όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών.



Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ : 2510/245684

Fax : 2510600421

Σωστή χρήση

φυτοφαρμάκων

σημειώνει

καλύτερη

φυτοπροστασία

οικονομία

προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν

### III. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας στις όψιμες ποικιλίες σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σταφύλια ώριμα ή σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.

### IV.ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Εμφανίζεται από το ξεκίνημα της ωρίμανσης των σταφυλιών και εκτείνεται κατά την πλήρη ωρίμανση των σταφυλιών. Οφείλεται σε βακτήρια και ζαχαρομύκητες. Μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα(μύγα του ξυδιού).

#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

Σωστή καταπολέμιση της ευδεμίδας, αποφυγή πληγών στα σταφύλια, καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και έγκαιρος ψεκασμός με μια πυρεθρίνη.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- 1 Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού.
  - 2.Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση. Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται.
  - 3.Ολοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν μόνο εφόσον λάβουμε υπόψη την υπολειμματική διάρκεια των γεωργικών φαρμάκων και το στάδιο ωρίμανσης των σταφυλιών και
  - 4.Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

