



Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.

Ε mail: dpvrgiotou@minagric.gr

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

No 29/12-07-2022



ΑΜΠΕΛΙ Ευδεμίδα

Η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται από τις φερομονικές παγίδες της υπηρεσίας μας βρίσκεται στο ξεκίνημά της. Επαναλαμβάνεται με έμφαση η σπουδαιότητα της διασφάλισης της ποιότητας των σταφυλιών από προσβολές της ευδεμίδας καθώς και η σοβαρή πιθανότητα ανάπτυξης, δευτερογενώς, προσβολών βοτρυτή ή / και όξινης σήψης επί των πρωτογενών προσβολών της ευδεμίδας.

Τούτων δοθέντων, συνιστάται η διενέργεια ψεκασμών στους αμπελώνες για την καταπολέμηση του εντόμου της ευδεμίδας με τη χρήση κατάλληλου εντομοκτόνου τις επόμενες δύο έως τέσσερις ημέρες, στην περίπτωση που επιλεγεί η χρησιμοποίηση ωοκτόνου – εντομοκτόνου. Ενώ στην περίπτωση χρήσης προνυμφοκτόνου - εντομοκτόνου ο ψεκασμός συνιστάται να λάβει χώρα περί τις 2 ή 3 ημέρες αργότερα δηλαδή, ενδεικτικά, περί το Σάββατο έως Δευτέρα. Ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα (κατά μέσο όρο) ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση, λόγω και της πολυπλοκότητας του θέματος, πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν γεωπόνος. Η καιρική αστάθεια που επικρατεί όλον τον προηγούμενο 1,5 μήνα καθιστά πολύτιμη την εξειδίκευση των οδηγιών που παρέχονται από τα τεχνικά δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις τοπικές συνθήκες από τον γεωπόνο που ασκεί την συνταγογράφηση.

Γενικότερα, η χρονική εγγύτητα με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών καθιστά αναγκαία την παροχή αυξημένης προσοχής στην τήρηση του χρονικού ορίου ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi). Έτσι συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ειδικά στις πρώιμες ποικιλίες ή / και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*). Συνιστάται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Βοτρύτης

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού μόνο όπου σημειωθεί προσβολή, σύμφωνα και με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που έχει εκδώσει η υπηρεσία μας.

Ωϊδιο

Μετά το γυάλισμα των ραγών (περκασμός), η ευπάθεια στην ασθένεια του ωιδίου μειώνεται και περιορίζεται μόνο στον βόστρυχο (τσαμπί), οπότε, στις πρώιμες ποικιλίες, συνήθως, δεν απαιτείται η χρήση ωιδιοκτόνου. Απαιτείται, όμως, αυξημένη προσοχή σε αμπελώνες όπου υφίσταται ενεργή προσβολή καθώς και σε αμπελώνες όψιμων ποικιλιών στις οποίες απέχει το στάδιο του «περκασμού».

Όξινη σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια)

Εμφανίζεται κατά την περίοδο ωρίμανσης των σταφυλιών. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια που δεν έγινε σωστή αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών και κυρίως της ευδεμίδας καθώς και όποιου άλλου παράγοντα προκαλεί λύσεις (πληγές) στην επιφάνεια των ραγών. Η προσβολή της όξινης σήψης μεταδίδεται από την κοινή δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Συνιστάται μόνο σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής και όχι προληπτικά, να διενεργείται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο ακολουθώντας πιστά και τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

- όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
- να τηρούν όσα προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες υλοποιούνται σε πλείστες περιπτώσεις- &
- να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές.
- Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpvrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr,
- Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων www.minagric.gr



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου