



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100

Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου – Ν. Λογοθέτης

10/26-03-12

Α. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

1. ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες:

Στις πρώιμες και όψιμες ποικιλίες να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θιράμ, Κάπταν, Ντιθιανόν.

Β.ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1.ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:

Οι μεσοπρώιμες και όψιμες ποικιλίες βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από τον μύκητα. Να συνεχιστεί η προστασία.

Φυτ/κά

προϊόντα:

1. Ροδακινια: *Ζιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ (1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο), Θιράμ, Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλосτρομπίν, Προπικοναζόλ, Προχλοράζ (μέχρι την πτώση πετάλων), Συπροντινίλ.*

2.Νεκταρινιά: *Ιπροντιόν, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλосτρομπίν, Προπικοναζόλ.*

2.ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Διαπιστώσεις:

Σε υπερπρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς στην περιοχή Σκαφιδακίου Αργολίδας, υπάρχουν προσβολές από εξώασκο.

Οδηγίες:

Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος που μεσολαβεί από την έκπτυξη του ακραίου φυλλοφόρου οφθαλμού και μέχρι τα φύλλα να αποκτήσουν το τελικό μέγεθος είναι κρίσιμη για την ασθένεια. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στις υπόλοιπες ποικιλίες για την αποφυγή προσβολών.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.

2.ΩΙΔΙΟ

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα βλαστούς και καρπούς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Η ασθένεια είναι πιο συχνή σε πυκνούς οπωρώνες ευπαθών ποικιλιών και σε φυτώρια. **Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι να αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα, είναι καθοριστικό για την ασθένεια.**

Οδηγίες: Την κρίσιμη περίοδο τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα. Να γίνει η πρώτη επέμβαση στις αρχές του σταδίου του σχισίματος του κάλυκα (**άμεσα στις υπερηρώιμες ποικιλίες**) και η επόμενη, μετά την πτώση του κάλυκα και πριν αρχίσει η σκλήρυνση του πυρήνα. Σε ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες χρειάζονται επιπλέον επεμβάσεις, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Φυτοпр/κά Προϊόντα: *Θείον, Μπουπιριμέιτ Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, {Πενκοναζόλ, μόνο σε ροδακινιά}, Μυκλομπουτανίλ, Τεμπουκοναζόλ .*

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ