



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

22 /17-5-12

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

**Οδηγίες:** Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

**α) Πρώιμες περιοχές: Από 23 έως 27 Μάη**

**β) Όψιμες περιοχές: Από 28 ως 31 Μάη.**

**Περιοχή Ήρας 25 έως 28 Μάη**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.*  
Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  
Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

#### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις των αυγών του εντόμου είναι σε εξέλιξη. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες κινούνται στη βλάστηση.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που την περσινή χρονιά υπήρχαν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα και οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό. Ο ψεκασμός εναντίον αυτής της γενιάς είναι καθοριστικός για την καταπολέμηση του εντόμου. Οι επόμενες επεμβάσεις, απλά μειώνουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.*

### **3.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 23 έως 27 Μάη.

**Φυτ/κά προϊόντα** *Θερινός πολτός, Φενοξυκάρμπ.*

### **4.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ**

Η Ισέρυα στη φύση ελέγχεται αποτελεσματικά από το αρπακτικό κολεόπτερο *Rodolia cardinalis*. Το κολεόπτερο αυτό (μοιάζει με την πασχαλίτσα), έχει 4-6 γενιές το χρόνο και ως προνύμφη και ενήλικο τρώει όλα τα βιολογικά στάδια της Ισέρυας.

**Διαπιστώσεις:** Οι προσβολές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών προνυμφών.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές και δεν υπάρχει το ωφέλιμο αρπακτικό, να γίνει επέμβαση από 23 έως 27 Μάη. Πριν αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να συμβουλευτείτε γεωπόνο για να ελεγχθεί η ύπαρξη του ωφέλιμου αρπακτικού.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **5.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

**Οδηγίες:** Άμεση έναρξη επεμβάσεων με τη λήψη του δελτίου σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.

**Φυτ/κά προϊόντα:** Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για ψεκασμούς κάλυψης εναντίον της Μύγας της Μεσογείου είναι οι εξής: *Δελταμεθρίν, Φοσμέτ* για πορτοκάλια και μανταρίνια και τα βιολογικά σκευάσματα με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα *Bauveria basiana* μόνο στη μανταρινιά. Επειδή αυτή την εποχή βρίσκονται σε έντονη δραστηριότητα όλα τα ωφέλιμα έντομα αρπακτικά και παράσιτα, είναι προτιμότεροι οι δολωματικοί ψεκασμοί. Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται συγκεντρωμένο με μορφή χονδρών σταγονιδίων **σε κλαδιά χωρίς καρπούς**. Συνιστάται να ψεκάζεται και η τυχόν υπάρχουσα βλάστηση στην περίμετρο του κτήματος (θάμνοι, φράκτες).

### **6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ**

**Διαπιστώσεις:** Δεν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα του εντόμου. Δεν χρειάζεται προς το παρόν επέμβαση. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

### **7. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

**Διαπιστώσεις** Να μην γίνονται επεμβάσεις. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το έντομο ελέγχεται αποτελεσματικά από το παράσιτό του, το οποίο και πρέπει να προστατευθεί από άσκοπες επεμβάσεις. Να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.



## **8. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

**Οδηγίες:** Χρειάζονται συχνοί και προσεκτικοί έλεγχοι. Επέμβαση απαιτείται όπου υπάρχουν προσβολές δηλαδή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.

**Φυτ/κά**

**προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 11/27-3-12.

## **9. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (*Aculops pelecassi*)**

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχει έντονη προσβολή και δεν έγινε προανθικός ψεκασμός να γίνει καταπολέμηση.

**Φυτ/κά**

**προϊόντα:** Βλέπε δελτίο 11/27-3-12.

## **10. ΑΦΙΔΕΣ**

**Διαπιστώσεις:** Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα). Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για αυτά τα έντομα, αλλά ευτυχώς και για τα αντίστοιχα ωφέλιμα που τα ελέγχουν.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά**

**προϊόντα:** Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, *Ασεταμιπρίντ*, *Δελταμεθρίν*, *Θιαμεθοξάμ*, *Πιριμικάρμπ*, *Πυρεθρίνς*, { *Πυμετροζίν* μόνο στην πορτοκαλιά }, *Τα-Φλουβαλινέιτ*, *Χλωρπυριφός*, *Χλωρπυριφός μεθύλ*.

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Όταν υπάρχει ανθοφορία ΔΕΝ γίνονται επεμβάσεις.
2. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.
3. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**