



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

34/1-8-12

ΑΜΠΕΛΙ

1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Η 3^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη με αραιούς πληθυσμούς. Επακόλουθο των προσβολών κυρίως αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες:

Σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές που κρίνεται απαραίτητη την επέμβαση αυτή να γίνει από 8 ως 12 Αυγούστου. Στις όψιμες περιοχές δεν απαιτείται επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης, {Πυρεθρίνης -2 μέρες}, {Άλφα σπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν- μπενζοϊτ, Λάμδα Συναλοθρίν - 7 μέρες}, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, {Ετοφενπρόξ, Μπέτα Σουφλουθρίν, Σπινοςάντ, Σουπερμεθρίν -14 μέρες}, {Χλωρπυριφός -20 μέρες}, {Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη.

2. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Σε αμπέλια που συνήθως εμφανίζονται προσβολές από βοτρυτή, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Φυτ/κά προϊόντα:

{Φενχεξαμίντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτραπέζια}, {Ιπροντιόν - 21 μέρες}, {Φλουαζινάμ μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 21 μέρες}, {Μποσκαλίντ, Σιπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ -28 μέρες}, {Πυριμεθανίλ-35 μέρες}, {Φολπέτ+οξυχλωριούχος χαλκός μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 42 μέρες}.

3.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Σας θυμίζουμε ότι για τις ρόγες ,κίνδυνος προσβολών υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ όλη την καλλιεργητική περίοδο.



**Φυτ/κά
προϊόντα:**

{Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες},
{Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, {Μπουπιριμέιτ -14 μέρες},
{Μεπτυλντινοκάπ, Μυκλομπουτανίλ, Τεμπουκοναζόλ -21μέρες},
{Μετραφενόλ, Προκουιναζίντ, Σιπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ,
Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες}, {Κυνοξιφέν -30 μέρες για οιν/μα & 21
μέρες για επιτραπέζια}, {Κρεσοξυμ μεθύλ
Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ,
Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ -35 μέρες}, {Φολπέτ+Τριαντιμενόλ,
Αζοξυστρομπίν + Φολπέτ - μόνο σε οινοποιήσιμα 42 μέρες}.

4.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Ελέγχετε συστηματικά τους αμπελώνες.

Οδηγίες: Όπου εντοπίζετε προσβολές να γίνεται επέμβαση
χρησιμοποιώντας σκεύασμα με προστατευτική και θεραπευτική
δράση (Βλέπε προηγούμενο δελτίο).

5.ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ-ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Οδηγίες: Βλέπε δελτίο 32/12-7-12.

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
- Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.
 - Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων στους καρπούς πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
 - Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ