



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι
η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή
διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: ΣΤ. ΤΣΟΛΗ

48/ 25-8-17

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις:

Ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόμου στις όψιμες περιοχές.

Οδηγίες

Σε μηλιές και αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά

προϊόντα:

1.Άμεσα με: Αμπαμεκτίν+Χλورانτρανιλιπρόλ (14 ημ.),
Ντιφλουμπενζουρόν(30 ημ.), Φενοξυκάρμπ (30 ημ.),
Χλورانτρανιλιπρόλ (14 ημ.).

2. Ως 28 Αυγούστου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8
(3 & 1 ημ. ανάλογα με το σκεύασμα), Βάκιλλος Θουριγγίας
(εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η
υψηλή UV ακτινοβολία 0 ημ.), Μεθοξυφenoζάιντ (14 ημ.),
Τεμπουφenoζάιντ (14 ημ.).

3.Από 29 Αυγούστου ως 1 Σεπτέμβρη:

Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.),
Εμαμεκτίν μπενζοείτ (3 ημ.), Ετοφενπρόξ (7 ημ.), Λάμντα Συαλοθρίν
(7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινোসάντ (14 ημ.), Σπινετοράμ
(7 ημ.), Τ-Φλουβαλινείτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.), Χλωπυριφός
μεθύλ (21 ημ.),].

Στις κυδωνιές των όψιμων περιοχών μπορείτε να επέμβετε:

1.Άμεσα με:

Χλورانτρανιλιπρόλ

1. Ως 28 Αυγούστου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ ψεκαστικού
διαλύματος 6-8, Βάκιλλος Θουριγγίας.

2. Από 29 Αυγούστου ως 1 Σεπτέμβρη:

Δελταμεθρίν, Σπινετοράμ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωπυριφός μεθύλ,
Χλωπυριφός.

2.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες:

**Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών ως την συγκομιδή στις
ποικιλίες που υπάρχουν δεδομένα προσβολών.**

Φυτ/κά

προϊόντα:

Δελταμεθρίν (7 ημ.) με ψεκασμό ή χρήση παγίδων με την ίδια δραστική
ουσία.

Β. ΚΑΡΥΔΙΑ

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Οδηγίες:

Στις καρυδιές μπορείτε να επέμβετε ως εξής:

1. Ως 28 Αυγούστου με:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος

6-8 , *Βάκιλλος Θουριγγίας* (εφαρμογή τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η υψηλή UV ακτινοβολία **0 ημ.**)

2. Από 29 Αυγούστου ως 1 Σεπτέμβρη:

Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**