



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**  
**ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**  
Πληροφορίες: **ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΣ**

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 2/1-8-11

**ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ:**

Αύξηση των συλλήψεων του Ψευδόκοκκου παρατηρήθηκε το γ' 10ήμερο του Ιουλίου ενώ και ο πληθυσμός της Κόκκινης Ψώρας βρίσκεται σε άνοδο. Η καταπολέμηση είναι απαραίτητη μόνο στα δένδροκομεία που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από τον ένα ή τους δύο παραπάνω εχθρούς.

Πρώιμες περιοχές: **6 – 9 Αυγούστου**. Μεσοπρώιμες περιοχές: **10 – 13 Αυγούστου**.

Οι θερινοί πολτοί και τα λάδια χρησιμοποιούνται μόνα τους ή σε συνδυασμό με ένα εντομοκτόνο. Επίσης δεν καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και ενδείκνυνται για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται βιολογική καταπολέμηση.

Παράλληλα με τη χημική καταπολέμηση συνιστώνται και κλαδέματα που συντελούν στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό των δένδρων.

**ΛΕΚΑΝΙΟ:**

Η παρουσία του εντόμου στα εσπεριδοειδή ευνοείται κυρίως σε δένδροκομεία υγρά, πυκνά, ακλάδευτα που δεν αερίζονται καλά.

Συστήνεται η καταπολέμηση με σκεύασμα που να καταπολεμά επίσης τον Ψευδόκοκκο ή την Κόκκινη Ψώρα, εφόσον υπάρχουν προσβολές και από τα δύο αυτά τα κοκκοειδή.

**ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ:**

Να μη γίνεται καμία επέμβαση με εντομοκτόνα εφόσον δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από κάποιον εχθρό στα εσπεριδοειδή.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από **Ψευδόκοκκο, Κόκκινη Ψώρα ή Λεκάνιο**, να προτιμηθούν **θερινοί πολτοί ή λάδια** που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο παράσιτο του Εριώδη Αλευρώδη.

### **ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ:**

Η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση των δένδρων, δημιουργώντας στοές. Στη συνέχεια τα φύλλα παίρνουν αργυρόχρωμη όψη και καρουλιάζουν.

### **Καλλιεργητικά μέτρα:**

1. Αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
2. Αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών που αποτελούν εστίες προσβολής.
3. Περιορισμός των αρδεύσεων στις απόλυτα αναγκαίες.

### **Χημική καταπολέμηση:**

Όταν ξεκινήσουν οι προσβολές, συνιστώνται επεμβάσεις κάθε 15 ημέρες κυρίως στα φυτώρια και στις νέες καλλιέργειες.

Ο ψεκασμός να κατευθύνεται στη νεαρή βλάστηση με χοντρές σταγόνες, ώστε να προκαλούνται λιγότερες ζημιές στα παράσιτα.

**ΣΗΜ:** Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Π. ΟΡΦΑΝΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ