



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Δελτίο  
Γεωργικών Προειδοποιήσεων  
Φυτοπροστασίας

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ,**  
**ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**ΑΧΑΪΑΣ**

Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ  
 Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238  
 Email: [pkpfpatr@minagric.gr](mailto:pkpfpatr@minagric.gr), [pkpfpatr-gp@minagric.gr](mailto:pkpfpatr-gp@minagric.gr)  
**Πληροφορίες:**  
 Πέττας Νίκος, Γεωπόνος PhD / MBA/ MSc

**ΕΛΙΑ**  
**Ν° 2 / 01-04-2021**

*Για τις περιοχές:*  
**ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,**  
**ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,**  
**ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ**

**Φαινολογικά**      Πρώιμες περιοχές: Στάδια Ε (διαχωρισμός τσαμπιού)  
**στάδια:**      Μεσοπρώιμες: Στάδια Δ-Ε (φούσκωμα ανθοφόρου τσαμπιού - διαχωρισμός τσαμπιού)  
                      Όψιμες περιοχές: Στάδια Β-Γ (φούσκωμα οφθαλμών-σχηματισμός ανθοφόρου τσαμπιού)

### **ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ**

**Συμπτώματα /** Τα συμπτώματα της ασθένειας γίνονται συνήθως αντιληπτά στο έλασμα των φύλλων -  
**Κύκλος**      «μάτι παγωνιού». Ο μύκητας προσβάλλει επίσης τους μίσχους των φύλλων και τους  
**μολύνσεων:**      ποδίσκους των καρπών. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται φυλλόπτωση και  
                      καρπόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε καχεξία. Σπανιότερα προσβάλλονται οι καρποί  
                      και οι νεαροί κλαδίσκοι. Οι ανοιξιότικες μολύνσεις είναι βασικής σημασίας καθώς από  
                      αυτές προέρχεται το αρχικό μόλυσμα για τις μολύνσεις της περιόδου.  
                      Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η βροχή ή η υψηλή υγρασία  
                      και οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

### **ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ ή ΠΑΣΤΕΛΑ ή ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ**

**Συμπτώματα /** Προκαλείται από το παθογόνο *Gloeosporium olivarum* syn. *Colletotrichum clavatum*.  
**Κύκλος**      Ενδημεί στη δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και στο Ιόνιο εξαιτίας των υψηλότερων  
**μολύνσεων:**      βροχοπτώσεων, των ήπιων σχετικά θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής  
                      ατμοσφαιρικής υγρασίας. Το παθογόνο διαχειμάζει στους μουμιοποιημένους καρπούς και  
                      μεγάλο πρόβλημα προκαλούν αυτοί που έχουν παραμείνει στο δένδρο. Οι πρωτογενείς  
                      μολύνσεις προκαλούνται κατά τη διάρκεια των ανοιξιότικων βροχοπτώσεων. Η  
                      ανθοφορία είναι το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξάπλωση του μύκητα,  
                      καθώς κατά την περίοδο αυτή το δυναμικό ανάπτυξης του εμφανίζει έξαρση. Ο μύκητας  
                      αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 12-25 °C, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλή  
                      υγρασία.

**Συστάσεις:**      Οι συνθήκες της τρέχουσας περιόδου είναι ευνοϊκές για μολύνσεις και από τα δύο  
                      παθογόνα. Ιδιαίτερα για το κυκλοκόνιο βλέπε τα γραφήματα. Συνιστάται η ταυτόχρονη  
                      αντιμετώπιση των δύο ασθενειών με 1-2 προληπτικούς ψεκασμούς με εγκεκριμένα  
                      μυκητοκτόνα με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση (στη 2<sup>η</sup> περίπτωση μετά από  
                      μολυσματική βροχόπτωση), σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και το αργότερο στο  
                      κρoκίασμα ανθέων.

## **ΚΑΛΟΚΟΡΗ**

**Ζημιά / Συμπτώματα:** Τρέφεται με τα άνθη και προκαλεί κυρίως οφθαλμόπτωση και πτώση ανθέων. Δευτερεύων πολυφάγος εχθρός, Ωστόσο, αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα κατά τόπους και κατά χρόνους με αποτέλεσμα η ζημιά από την πτώση των οφθαλμών και των ανθέων να σημειώνεται ορισμένες φορές είτε σε ευρύτερες περιοχές, είτε σε ορισμένους ελαιώνες, είτε ακόμα σε ορισμένα δένδρα ενός ελαιώνα. Αυτήν την εποχή, πυκνοί πληθυσμοί προνυμφών βρίσκονται σε ποώδη ζιζάνια (πχ. παριετάρια, τσουκνίδα, σινάπι, αγριοσέλινο, γαλατσίδα).

**Συστάσεις:** Συνιστάται η εβδομαδιαία παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου με τινάγματα κλάδων ελιάς σε φύλλα χαρτιού, από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του ανθοφόρου οφθαλμού και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της ταξιανθίας (στάδιο μούρου). Η πληθυσμιακή πυκνότητα κατά την οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης είναι 4-6 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70 εκ.

Αντιμετώπιση

- Προτείνεται η διατήρηση των αυτοφών φυτών (ζιζανίων) μέχρι την έναρξη της άνθησης των ελαιόδένδρων.
- Συνιστάται διενέργεια ψεκάσμου εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί στα ελαιόδεντρα και χαμηλό ποσοστό ανθοφορίας.

## **ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ**

**Ζημιά / Συμπτώματα:** Προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα άνθη (ανθόβια γενεά), η δεύτερη αναπτύσσεται στον καρπό (καρπόβια) και η τρίτη στο φύλλωμα (φυλλόβια γενεά). Την περίοδο αυτή οι πρώτες προνύμφες της διαχειμάζουσας γενεάς (φυλλοφάγου) συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους.

**Συστάσεις:** Προς το παρόν δεν απαιτείται επέμβαση.

## **Φυτοπροστατευτικά**

Επιλογή από τα [εγκεκριμένα σκευάσματα](#), έκδοσης **01/04/2021**, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου για την επιλογή του φυτοπροστατευτικού και της δοσολογίας εφαρμογής. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας Εφαρμόζετε, αποκλειστικά, εγκεκριμένα σκευάσματα. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές, να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα δράσης. Τηρείτε αυστηρά την αναγραφόμενη ελάχιστη απόσταση από τη συγκομιδή.


**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC**


Τα δελτία αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
Δωρεάν παραλαβή των δελτίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, με απλό αίτημα στα email της υπηρεσίας μας.

## Επικινδυνότητα κυκλοκόνιου ελιάς


**Σχήμα 1.**  
Πίεση Κυκλοκόνιου  
Μεσσηνία (Βελίκα)



**Σχήμα 2.**  
Πίεση Κυκλοκόνιου  
Ηλεία (Κόροιβος)



**Σχήμα 3.**  
Πίεση Κυκλοκόνιου  
Ηλεία (Ολυμπία)



*Στοές Πορηνοτρίτη*



*Προνύμφη Βρωμούσας (Καλόκορη)*

