



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkrfpet1@otenet.gr

Νο 14 / 18 Μαΐου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

- Αρχισε η πρώτη πτήση του εντόμου σε όλες τις περιοχές και συνεχίζεται η πτήση της καρπόκαψας της ροδακινιάς.
- Η Ανάρσια είναι σπουδαιότερος εχθρός της ροδακινιάς σε σχέση με την Καρπόκαψα για την περιοχή μας. Η αντιμετώπιση της Καρπόκαψας της ροδακινιάς θα γίνει σε συνδυασμό με της Ανάρσιας.
 - Οι πρώτες εκκολάψεις της γενιάς αυτής αναμένονται στις 28 - 29 Μαΐου.
 - Η ζημιά είναι δύο ειδών:
 - α. προσβολή των κορυφαίων βλαστών (βλαστορύκτες)
 - β. προσβολή των καρπών
 - Η προσβολή στους βλαστούς είναι σημαντική συνήθως μόνο στα φυτώρια και στις νέες φυτείες.
 - Η προσβολή των καρπών αρχίζει να γίνεται σημαντική στην αρχή της ανάπτυξης του χρώματος, περίπου 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Αν στην καλλιέργεια παρατηρήθηκαν πάνω από 3-4 κορυφές σε κάθε δένδρο με προσβολή από τη γενιά που διαχειμάσε, τότε κρίνεται απαραίτητη η καταπολέμηση.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

1. Από 20 έως 28 Μαΐου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ ή
 2. 20 - 21 Μαΐου με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ (σκεύασμα CORAGEN) ή
 3. Στις 27 - 28 Μαΐου να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας (με επανάληψη στις 7 ημέρες), ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ ή
 4. 28 - 30 Μαΐου κλασσικά εντομοκτόνα, όπως ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, κ.α.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό.

B. ΑΦΙΔΕΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

Σημειώνεται γενικά μια έξαρση των προσβολών. ΣΥΝΗΘΩΣ οι ψεκασμοί για καρπόκαψα - βαμβακάδα - φυλλοδέτη κπλ., τις ελέγχουν ικανοποιητικά. **ΜΟΝΟ** σε σοβαρές προσβολές συνιστάται ξεχωριστή καταπολέμηση με *ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ*, *ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ*, *ΑΚΕΤΑΜΠΡΙΝΤ*, *ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ*, *ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ*, *ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ*, κ.α.

Γ. ΘΡΙΠΕΣ (ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ)

Όπου παρατηρούνται αυξημένοι πληθυσμοί (συνιστάται η χρήση χρωματικών παγίδων) και συνήθως παρατηρούνται ζημιές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τις αφίδες και τον φυλλοδέτη (Δελτίο Νο13/11-5-11).

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη