



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkpfpet1@otenet.gr](mailto:pkpfpet1@otenet.gr)

**Νο 27 / 14 Αυγούστου 2012**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

### **ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

#### **A. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

Αναμένεται η εμφάνιση των προνυμφών της γ' γενεάς. Μόνο όπου δεν έγιναν ή απέτυχαν οι προηγούμενες εφαρμογές:

◆ Σε οπωρόνες με σοβαρές προσβολές συνιστάται ψεκασμός:

α. ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 18 - 20 Αυγούστου

β. ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 24 - 26 Αυγούστου

και επανάληψη του ψεκασμού σε 12 - 14 ημέρες.

◆ Σε ελαφρότερες προσβολές συνιστάται μόνο ένας ψεκασμός στα πεδινά 25 - 27 Αυγούστου και στα ορεινά - όψιμα 1 - 3 Σεπτεμβρίου.

◆ Κατάλληλα φάρμακα: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, κ.α.

**ΣΗΜ.:** Εάν γίνει ψεκασμός με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, αρκεί μόνο μία εφαρμογή.

#### **B. ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ**

Ξεκίνησε η 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου. Δεν συνιστάται γενικά καταπολέμηση.

Σε περίπτωση που παραλήφθηκαν ή απέτυχαν οι προηγούμενες επεμβάσεις και υπάρχει **σοβαρό πρόβλημα**, συνιστάται καταπολέμηση :

α. Στις ΠΡΩΪΜΕΣ - ΠΕΔΙΝΕΣ περιοχές, στις 22 - 23 Αυγούστου

β. Στις ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ περιοχές, στις 25 - 27 Αυγούστου

Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά από 12-14 ημέρες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α  
Πολυμέρου Βάιος