



No 7 / 4 Απριλίου 2013

Υφούλης Αντώνης
Λαΐδου Ιωάννα
Μακρίδου Ευγενία

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ**(*Uncinula necator* Schwein Burrill)**

- Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου.
- Είναι βασικής σημασίας η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος.
- Για την διαπίστωση μολύσματος που διαχέισαε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιθεώρηση κατά το κλάδεμα των κληματίδων. Κληματίδες με σκουρόχρωμες δικτυώσεις στην επιφάνεια είναι απόδειξη έντονης προσβολής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.



Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν από νωρίς με την έκπτυξη της νέας βλάστησης οι λεγόμενοι «βλαστοί σημαίες». Είναι βλαστοί μικροί, που δεν αναπτύσσονται, με φύλλα «καρουλιασμένα» και καλυμμένα με μια γκρι σκόνη. Ύπαρξη τέτοιων βλαστών δείχνει ότι το παθογόνο υπήρχε στον οφθαλμό, όπου διαχέισαε, και μόλυνε το βλαστό κατά την έκπτυξη του οφθαλμού.

- Να γίνει απαραίτητα επέμβαση στο στάδιο Ε (3 φύλλα, μήκος βλαστού τουλάχιστον 7 εκ.) σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά και σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες. Ο ψεκάσμός αυτός θεωρείται καθοριστικός για την παραπέρα εξέλιξη της ασθένειας.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Azoxystrobin, Boscalid, Bupirimate, Copper oxychloride + Sulphur, Cyproconazole, Dimethomorph, Fenbuconazole, Kresoxim-methyl, Laminarin, Metrafenone, Myclobutanil, Penconazole, Propineb, Proquinazid, Pyraclostrobin, Sulphur, Tebuconazole, Tetraconazole, Triadimenol, Trifloxystrobin.

**E**

- Εάν επιλεγεί θειάφι καταπολεμείται και το Άκαρι της Ερίνωσης (*Eriophyes vitis*, Acari: Eriophyidae)
- Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος να εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα μέχρι και την άνθηση η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών.

Με τις προτεινόμενες δειγματοληψίες ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τόσο εάν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε επέμβαση καθώς και τον κατάλληλο χρόνο διενέργειάς της

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη